

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

- H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- P102 Manter fora do alcance das crianças
P103 Ler atentamente e seguir todas as instruções.
P262 Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
- P273 Evitar a libertação para o ambiente.
P280 Usar luvas de proteção.
P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.
SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. [Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície / Evitar contaminações pelos sistemas de drenagem de água nas explorações agrícolas e nas estradas].
- SPgPT4 Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.
- SPgPT6 Não armazenar a temperaturas superiores a 30 °C.
SPo2 Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de proteção.



ATENÇÃO

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), Telef.: 800 250 250

PRIMEIROS SOCORROS

Conselho geral: retirar a pessoa da zona de perigo. Se os sintomas aparecerem e persistirem, consultar um médico.

Depois da inalação: Levar a pessoa para o ar fresco.

Após contacto com os olhos: Lavar os olhos com bastante água durante pelo menos 15 minutos.

Após contacto com a pele: Lavar imediatamente com água e sabão. Depois de engolir: Não induzir o vómito. Chamar imediatamente um médico.



A embalagem das armadilhas e das recargas, depois de inutilizadas, assim como as armadilhas, depois de usadas, deverão ser entregues num ponto de retoma autorizado.

RECARGAS MOSKISAN®

Para armadilhas de captura dos adultos da mosca-do-Mediterrâneo (*Ceratitis capitata*) em fruteiras e videira, pela técnica de atração e morte

Contém:

Killdisk® pronto a usar (RB) contendo 0,04 g (0,027% p/p) de esfenvalerato / armadilha

e

Atrativo constituído por acetato de amónio e hidrócloro de trimetilamina

Autorização de venda n.º 1956 concedida pela DGAV

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Contém: 25 unidades (25 Killdisk® + 25 atrativos)

Número de lote e data de produção: Ver caixa e embalagem

Prazo de validade: 2 anos após data de produção

Titular da AV / distribuidor:
SANSAN PRODESING, S.L.
Pol. Ind. Los Vientos C/ Virazón, 1, CD 1506
46119 Nàquera, Valencia, Espanha

Distribuidor:
BIOSANI,
Quinta de São Brás, Serra do Louro
2950-354 Palmela, Portugal
info@biosani.com | www.biosani.com

SANSAN
PRODESING, S.L.

BIOSANI
Agricultura Biológica e Protecção Integrada, lda.

INDICAÇÕES RELATIVAS À SUA UTILIZAÇÃO (INCLUINDO AS PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS)

MOSKISAN® é uma armadilha para captura de adultos de mosca-do-Mediterrâneo (*Ceratitis capitata*) em espécies fruteiras e videira, pela técnica de atração e morte.

A armadilha contém um disco (Killdisk®) impregnado com inseticida, esfenvalerato, na parte interior da tampa, e um atrativo constituído por acetato de amónio e hidrócloro de trimetilamina. Os adultos de mosca-do-Mediterrâneo são atraídos para dentro da armadilha e em contacto com o inseticida acabam por morrer.

Esfenvalerato pertence ao grupo dos piretróides, atua por contacto ao nível do sistema nervoso dos insetos, como modelador dos canais de sódio (IRAC MoA grupo 3A).

UTILIZAÇÃO, DOSES, EPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

As armadilhas devem ser colocadas desde o estado fenológico BBCH 71 (desenvolvimento do fruto) e mantidas até à colheita. O Killdisk® e o atrativo são eficientes pelo menos durante 120 dias.

Cultura	Dose
Laranjeira, tangerineira (inclui clementina e híbridos), laranja azeda, lima, limoeiro, toranja e pomelo.	50 armadilhas/hectare
Macieira, pereira, pera-nashi, marmeleiro, nespereira, pessegueiro (inclui nectarina), damasqueiro, ameixeira e cerejeira	75 armadilhas/hectare
Videira (uva para mesa e para vinificação)	75 armadilhas/hectare
Diospireiro	75 armadilhas/hectare

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

É necessário proceder a uma boa monitorização da praga, a fim de detetar aumentos súbitos dos níveis populacionais da praga, para se necessário utilizar meios de luta complementares, nomeadamente, efetuar um tratamento com inseticida autorizado para a finalidade.

MODO DE APLICAÇÃO

As armadilhas devem ser distribuídas de forma homogénea pela parcela, podendo reforçar-se um pouco mais nas bordaduras, normalmente por onde entra a mosca-da-fruta.

A armadilha deve ser colocada, manualmente, mais ou menos a meio da altura da copa (1,5-2 metros do solo), na parte sudeste da árvore onde existam folhas suficientes, para que a armadilha fique protegida. Após colocar no ramo, deve fechar o gancho da tampa.

NOTA: Mesmo que todos os cuidados sejam empreendidos, a SanSan Prodesing S.L. não aceita qualquer responsabilidade pela falta de eficácia do produto, caso as instruções do rótulo não sejam seguidas.